

PROTEINADO MULTI AS

Suplemento mineral protéico energético com vitaminas, indicado para uso contínuo (águas e secas) por bovinos de corte mantidos em pastagens.

Modo de usar: Fornecer o produto nos cochos saleiros, deixando à disposição dos animais para livre consumo.

Níveis de garantia: em elementos ativos por kg do produto.

Elemento	Parâmetro	Valor	Unidade
Umidade	Máximo	110,00	g
Proteína Bruta	Mínimo	300,00	g
Proteína Degradável no Rúmen	Estimada	259,00	g
NNP (equivalente protéico)	Máximo	197,00	g
Extrato Etéreo	Mínimo	17,00	g
Fibra Bruta	Máximo	55,00	g
FDA – Fibra Detergente Ácido	Máximo	80,00	g
Matéria Mineral	Máximo	325,00	g
Cálcio	Mínimo	38,00	g
Cálcio	Máximo	43,00	g
Cobalto	Mínimo	6,00	mg
Cobre	Mínimo	110,00	mg
Enxofre	Mínimo	5.500,00	mg
Ferro	Mínimo	145,00	mg
Fósforo	Mínimo	5.500,00	mg
Iodo	Mínimo	9,00	mg
Magnésio	Mínimo	1.250,00	mg
Manganês	Mínimo	150,00	mg
Selênio	Mínimo	1,67	mg
Sódio	Mínimo	70,00	g
Zinco	Mínimo	375,00	mg
Monensina	Mínimo	200,00	mg
Vitamina A	Mínimo	6.000,00	UI
Vitamina D3	Mínimo	1.200,00	UI
Vitamina E	Mínimo	28,80	UI
Lisina	Mínimo	4.599,00	mg
Metionina	Mínimo	1.470,00	mg
NDT	Estimado	455,00	g
Energia Metabolizável (EM)	Estimada	1.906,00	kcal
Flúor	Máximo	55,00	mg

Composição qualitativa: produto formulado à base de fubá de milho, farelo de trigo, farelo de algodão, farelo de soja, uréia pecuária, minerais, vitaminas e promotor de crescimento. Pode conter outros alimentos opcionais.

Modo de usar: necessário fazer adaptação dos animais ao iniciar o uso do produto. Após adaptação fornecer puro nos cochos saleiros. Fazer reposição periódica conforme o consumo, não deixando faltar.

Consumo diário esperado: média de 100 gramas do produto para cada 100 kg de peso vivo dos animais, variando pela condição dos cochos, das pastagens, do manejo, etc.

Fornecer em cocho coberto com sistema que evite acúmulo de água. Não fornecer para animais em jejum, famintos ou debilitados, bem como para bovinos com menos de dois meses de idade. Manter boa disponibilidade de pasto.

Prazo de validade: 180 dias após a data de fabricação.

Restrições: Este produto contém Monensina, não deve ser fornecido a equídeos sob o risco de intoxicação, que pode ser fatal.