

BOV LEITE NOVILHAS

Indicada para bovinos jovens pós desmama (novilhas, tourinhos e garrotes), para ser usada por toda fase de crescimento (recria).

Modo de usar: Fornecer na relação entre 0,8 e 1,2% do peso vivo dos animais, variando de acordo com a condição corporal e a taxa de crescimento desejada.

Níveis de garantia: em elementos ativos por kg do produto.

| Elemento | Parâmetro | Valor | Unidade |
|------------------------------|-----------|----------|---------|
| Umidade | Máximo | 130,00 | g |
| Proteína Bruta | Mínimo | 180,00 | g |
| Proteína Degradável no Rúmen | Estimada | 138,00 | g |
| NNP (equivalente proteína) | Máximo | 70,20 | g |
| Extrato Etéreo | Mínimo | 26,00 | g |
| Fibra Bruta | Máximo | 75,00 | g |
| FDA – Fibra Detergente Ácido | Máximo | 95,00 | g |
| Matéria Mineral | Máximo | 105,00 | g |
| Cálcio | Mínimo | 5,00 | g |
| Cálcio | Máximo | 8,00 | g |
| Cobalto | Mínimo | 0,33 | mg |
| Cobre | Mínimo | 16,00 | mg |
| Enxofre | Mínimo | 156,00 | mg |
| Fósforo | Mínimo | 5.500,00 | mg |
| Iodo | Mínimo | 0,80 | mg |
| Magnésio | Mínimo | 110,00 | mg |
| Manganês | Mínimo | 26,00 | mg |
| Selênio | Mínimo | 0,30 | mg |
| Sódio | Mínimo | 1.950,00 | mg |
| Zinco | Mínimo | 50,00 | mg |
| Vitamina A | Mínimo | 5.000,00 | UI |
| Vitamina D3 | Mínimo | 1.200,00 | UI |
| Vitamina E | Mínimo | 20,00 | UI |
| Monensina | Mínimo | 27,00 | mg |
| Lisina | Mínimo | 4.420,00 | mg |
| Metionina | Mínimo | 1.780,00 | mg |
| NDT | Estimado | 674,00 | g |
| Energia Metabolizável (EM) | Estimada | 2.790,00 | kcal |
| Sacarina | Mínimo | 58,20 | mg |
| Neoespiridina | Mínimo | 1,20 | mg |

Composição qualitativa: ração formulada à base de fubá de milho, farelo de algodão, farelo de trigo, uréia pecuária, minerais e vitaminas. Pode conter outros alimentos opcionais.

Prazo de validade: **90 dias após a data de fabricação.**

Outras recomendações: para animais alimentados em grupos (lotes), atentar que o cocho deve ter dimensões adequadas para evitar competição no momento do arraçoamento, dessa forma permitindo consumo regular e o desempenho uniforme dos animais.

Restrição: Este produto contém Monensina Sódica, portanto não deve ser administrado a equídeos sob o risco de intoxicação, que pode ser fatal.