

# CONFINA GRÃO INTEIRO

**Indicado para fabricação de ração para bovinos de corte em fase de terminação (engorda para abate), em sistema de confinamento, utilizando a mistura com milho integral em grãos como dieta única.**

**Modo de usar:** Adicionar 150 kg do produto por tonelada de ração a fabricar, misturando com milho integral em grãos.

**Níveis de garantia:** em elementos ativos por kg do produto.

Elemento	Parâmetro	Valor	Unidade
Umidade	Máximo	130,00	g
Proteína Bruta	Mínimo	320,00	g
Proteína Degradável no Rúmen	Estimada	256,00	g
NNP (equivalente protéico)	Máximo	169,00	g
Extrato Etéreo	Mínimo	28,00	g
Fibra Bruta	Máximo	80,00	g
FDA – Fibra Detergente Ácido	Máximo	105,00	g
Matéria Mineral	Máximo	210,00	g
Cálcio	Mínimo	25,00	g
Cálcio	Máximo	32,00	g
Cobalto	Mínimo	2,10	mg
Cobre	Mínimo	39,70	mg
Enxofre	Mínimo	2.970,00	mg
Ferro	Mínimo	52,00	mg
Fósforo	Mínimo	7.000,00	mg
Iodo	Mínimo	3,20	mg
Magnésio	Mínimo	6.950,00	mg
Manganês	Mínimo	54,00	mg
Selênio	Mínimo	0,60	mg
Sódio	Mínimo	7.650,00	mg
Zinco	Mínimo	135,00	mg
Vitamina A	Mínimo	5.000,00	UI
Vitamina D3	Mínimo	1.000,00	UI
Vitamina E	Mínimo	24,00	UI
Monensina	Mínimo	177,00	mg
Lisina	Mínimo	6.959,00	mg
Metionina	Mínimo	1.928,00	mg
NDT	Estimado	550,00	g
Energia Metabolizável (EM)	Estimada	2.299,00	kcal

**Composição qualitativa:** produto formulado à base de fubá de milho, farelo de soja, farelo de trigo, farelo de algodão, uréia pecuária, minerais, vitaminas e promotor de crescimento. Pode conter outros alimentos opcionais.

**Modo de usar:** Após misturado ao milho, essa mistura será fornecida como alimento único da dieta dos animais após a fase de adaptação. Adaptação recomendada: iniciar o tratamento fornecendo 2,0 kg por animal/dia. Aumentar o fornecimento diariamente em 500 gramas/animal (sempre acompanhando a aceitação). Após 15 dias os animais estarão totalmente adaptados, consumindo unicamente a mistura que deve ser fornecida à vontade, nunca deixando faltar nos cochos. Dividir o fornecimento da mistura em ao menos dois tratamentos diários.

**Prazo de validade:** 90 dias após a data de fabricação.

**Restrições:** Este produto contém Monensina, não deve ser fornecido a equídeos sob o risco de intoxicação, que pode ser fatal. Não fornecer a bezerros/as jovens (menores de 4 meses de idade).