

PROTEINADO ÁGUAS

Suplemento mineral protéico energético de pronto uso para bovinos.

Indicado para bovinos de corte de todas as idades mantidos em pastagens verdes na época das águas (primavera, verão e início do outono).

Modo de usar: Fornecer o produto nos cochos saleiros, deixando à disposição dos animais para livre consumo.

Níveis de garantia: em elementos ativos por kg do produto.

Elemento	Parâmetro	Valor	Unidade
Umidade	Máximo	110,00	g
Proteína Bruta	Mínimo	210,00	g
Proteína Degradável no Rúmen	Estimada	162,00	g
NNP (equivalente protéico)	Máximo	115,00	g
Extrato Etéreo	Mínimo	25,00	g
Fibra Bruta	Máximo	85,00	g
FDA – Fibra Detergente Ácido	Máximo	95,00	g
Matéria Mineral	Máximo	250,00	g
Cálcio	Mínimo	24,00	g
Cálcio	Máximo	29,00	g
Cobalto	Mínimo	6,00	mg
Cobre	Mínimo	110,00	mg
Enxofre	Mínimo	600,00	mg
Ferro	Mínimo	145,00	mg
Fósforo	Mínimo	7.000,00	mg
Iodo	Mínimo	9,00	mg
Magnésio	Mínimo	1.250,00	mg
Manganês	Mínimo	150,00	mg
Selênio	Mínimo	1,67	mg
Sódio	Mínimo	48,00	g
Zinco	Mínimo	375,00	mg
Monensina	Mínimo	200,00	mg
Lisina	Mínimo	3.473,00	mg
Metionina	Mínimo	1.266,00	mg
NDT	Estimado	540,00	g
Energia Metabolizável (EM)	Estimada	2.228,00	kcal
Flúor	Máximo	60,00	mg

Composição qualitativa: produto formulado à base de fubá de milho, farelo de trigo, farelo de algodão, farelo de arroz, uréia pecuária, minerais, vitaminas e promotor de crescimento. Pode conter outros alimentos opcionais.

Modo de usar: necessário fazer adaptação dos animais ao iniciar o uso do produto. Após adaptação fornecer puro nos cochos saleiros. Fazer reposição periódica conforme o consumo, não deixando faltar.

Consumo diário esperado: média de 200 gramas do produto para cada 100 kg de peso vivo dos animais, variando pela condição dos cochos, das pastagens, do manejo, etc.

Cuidados e restrições: Fornecer em cocho coberto com sistema que evite acúmulo de água. Não fornecer para animais em jejum, famintos ou debilitados, bem como para bovinos com menos de dois meses de idade. Manter boa disponibilidade de pasto, mesmo que de baixa qualidade.

Prazo de validade: 180 dias após a data de fabricação.

Restrições: Este produto contém Monensina, não deve ser fornecido a equídeos sob o risco de intoxicação, que pode ser fatal.